















Mælkebøtte
Kulike

Bunke

Artemisia

Udten, hvide blomster og
bunke, der alle har ind-

te blade og frøene

hvide og kurve samlet i store

bløde stilkede stande

Kurven indeholder udelukkende

blomster med blomster, disse er

alle tvækknede eller også er de

med blomsterne humlige

Kurubunden er nøgen, frugt

er en mangler frø

Bunke artene har

støtning i m

fløste an

og de

og de

og de

og de

og de

og de

og de

og de

De store

stolde i toppen

af kurven

er de store

blomster

og de

og de

og de

og de

og de

og de

og de

og de

og de

og de

og de

og de

og de

og de

og de

De store

stolde i toppen

af kurven

er de store

blomster

og de

og de

og de

og de

og de

og de

og de

og de

og de

og de

og de

og de

og de

og de

og de

De store

stolde i toppen

af kurven

er de store

blomster

og de

og de

og de

og de

og de

og de

og de

og de

og de

og de

og de

og de

og de

og de

og de

De store

stolde i toppen

af kurven

er de store

blomster

og de

og de

og de

og de

og de

og de

og de

og de

og de

og de

og de

og de

og de

og de

og de

De store

stolde i toppen

af kurven

er de store

blomster

og de

og de

og de

og de

og de

og de

og de

og de

og de

og de

og de

og de

og de

og de

og de

De store

stolde i toppen

af kurven

er de store

blomster

og de

og de

og de

og de

og de

og de

og de

og de

og de

og de

og de

og de

og de

og de

og de

Disse spredes med vinden når
den om vinteren rusker i de
visne stift oprette stængler
(Planten er vinterstander)

Denne form for frøstand
er betydelig i det botaniske
fagsprog som "apomiksis"
dvs. uden befrugtning
i de Nordiske lande 500 arter

Slægten omfatter 100 arter
2 i Danmark

Slægten omfatter 120 arter i Danmark. En 30-40 cm høj flerårig plante med kant fyk kronet som stjerneagtige hjerteformede tilspidsede blade og i midten 3 små og yderste 5 store blomster som i levende farve står på lange stængler. Disse er rykket ud i julen og sættes i vand og blomsterne vil stå i længere tid. De fleste blomster er hvide eller lyse røde. Frugterne består af 2, som lang fjerneformede beskyttelseskapsler, der ved modenhed står ud fra hinanden. I tørt vejr åbner beskyttelseskapslerne sig på deres bugside så frøene med deres flyvehår kan træde frem og frøene blæses bort med vinden.

Slægtsnavnet *Cynanchum* er afledt af det græske ord *kyon* = almindelig og *anchos* = kvæder og skal efter sigende hentyde til at værtejens høje art er giftig for hunde.

Flere arter med store, fjerneformede blomster som indeholder gule og røde farvestoffer. Blomsterne er 5-10 cm lange og består af 2 blade og 3 stængler. Disse er rykket ud i julen og sættes i vand og blomsterne vil stå i længere tid. De fleste blomster er hvide eller lyse røde. Frugterne består af 2, som lang fjerneformede beskyttelseskapsler, der ved modenhed står ud fra hinanden. I tørt vejr åbner beskyttelseskapslerne sig på deres bugside så frøene med deres flyvehår kan træde frem og frøene blæses bort med vinden.

Slægten har 9 arter heraf 1 i Norden. Vokser på frodig muldbund i lyse skove langs søer og hegn.

Flere arter med store, fjerneformede blomster som indeholder gule og røde farvestoffer. Blomsterne er 5-10 cm lange og består af 2 blade og 3 stængler. Disse er rykket ud i julen og sættes i vand og blomsterne vil stå i længere tid. De fleste blomster er hvide eller lyse røde. Frugterne består af 2, som lang fjerneformede beskyttelseskapsler, der ved modenhed står ud fra hinanden. I tørt vejr åbner beskyttelseskapslerne sig på deres bugside så frøene med deres flyvehår kan træde frem og frøene blæses bort med vinden.

Slægten har 9 arter heraf 1 i Norden. Vokser på frodig muldbund i lyse skove langs søer og hegn.

Flere arter med store, fjerneformede blomster som indeholder gule og røde farvestoffer. Blomsterne er 5-10 cm lange og består af 2 blade og 3 stængler. Disse er rykket ud i julen og sættes i vand og blomsterne vil stå i længere tid. De fleste blomster er hvide eller lyse røde. Frugterne består af 2, som lang fjerneformede beskyttelseskapsler, der ved modenhed står ud fra hinanden. I tørt vejr åbner beskyttelseskapslerne sig på deres bugside så frøene med deres flyvehår kan træde frem og frøene blæses bort med vinden.

Slægten har 9 arter heraf 1 i Norden. Vokser på frodig muldbund i lyse skove langs søer og hegn.

Kangroen
Hypochaeris

En eller flerårig, mælkesaftig plante med store, hvide blomster. Blomsterne er 5-10 cm lange og består af 2 blade og 3 stængler. Disse er rykket ud i julen og sættes i vand og blomsterne vil stå i længere tid. De fleste blomster er hvide eller lyse røde. Frugterne består af 2, som lang fjerneformede beskyttelseskapsler, der ved modenhed står ud fra hinanden. I tørt vejr åbner beskyttelseskapslerne sig på deres bugside så frøene med deres flyvehår kan træde frem og frøene blæses bort med vinden.

Ved blomsternes grundstillet små alle hundestige arter.

Melurt
Antennaria

En stærk duftende plante som er græsagtig. Blomsterne er 5-10 cm lange og består af 2 blade og 3 stængler. Disse er rykket ud i julen og sættes i vand og blomsterne vil stå i længere tid. De fleste blomster er hvide eller lyse røde. Frugterne består af 2, som lang fjerneformede beskyttelseskapsler, der ved modenhed står ud fra hinanden. I tørt vejr åbner beskyttelseskapslerne sig på deres bugside så frøene med deres flyvehår kan træde frem og frøene blæses bort med vinden.

Del danske navn Melurt betyder melurt og sigter til at man kan bruge den til at gøre smag af fisk.

Dunhammer
Typha

En flerårig, stængelplante med tykke, vandrette jordstængler og lange, lineære blade. Blomsterne har en bestøvning. Frugten er en lille klatte og den falder ved modenheden af sammen med sin stilk. Hvis lange hår først tjener som svæveapparat i luften og senere får stænglerne til at flyde på vandet.

15 arter 2 i Norden.

Dunhammeren er den vigtigste af de "muskedamer" og "fløgekeller" kendes let på den tykke blomsterstængel. Hjulblomsterne falder af og lader blot en nøgen top oven på frugtstanden.

Dueart
Epilobium

En eller flerårig, mælkesaftig plante med små, hvide blomster. Blomsterne er 5-10 cm lange og består af 2 blade og 3 stængler. Disse er rykket ud i julen og sættes i vand og blomsterne vil stå i længere tid. De fleste blomster er hvide eller lyse røde. Frugterne består af 2, som lang fjerneformede beskyttelseskapsler, der ved modenhed står ud fra hinanden. I tørt vejr åbner beskyttelseskapslerne sig på deres bugside så frøene med deres flyvehår kan træde frem og frøene blæses bort med vinden.

Slægten omfatter 160 arter i Danmark.